Nedeltchev VI-4

Vass7R10s386-390



Collection Vassal-Montpellier

2918Mtp1

dantadantadantadantad

to the sale sale is a

Nedeltchef II.4 7 R10 1 386.330







nhantanhantanhantanh

ANNEE 1989
NOM Nedeltchef II.4 EMPLACEMENT 7 B10 5 386 390
291801

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1	9,	13.3	163 ×	0								
2 8	3	13,3	163 ×	0								
3 %					0							
4 %	2	8,3	133×	0								
5	4	13,3	163.	0								
Pot	erritu		Mi 3.89		,	Port :	eria	je	Vic	gueur	:15	

N 29	NOM Nedeltchef VI-4 EMPLACEMENT 7 Rg 10 1 386.390												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	erti Floraison Véraison ité début mi/f fin début mi/v						Maturité	
1	2	21,3	26.3.	0	1	12,6	176	20.6	138	to 8	268	23.9	
2 3 4 5	2 4	21,3 18,3	26.3. 26.3. 21.3.		Grappe Pour : Baie :	G - O TG - disc-sp : B- : s - : avec	M - P Mil h-ell cr-Rs- m - a:	Dim 1 ; C - P I - ov-ol Rg-N r - fc yrène	Dim: £	Compact 2 x local-fus incompact inco	cité	: L - M- C)	

T. Colot, Bulgarie

ANNEE 1992 NOM Nedeltehef II 4 291801

4 R10 1 386.330 EMPLACEMENT

Souche	Nbre yeux	Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3	1 1 2	19.3							1.8	4.8	8.8	31.8 +3 : L - M -9
	2	16.3	19.3 *	0	Pour : Baie :	DC = (Mil M	1 : O	im . 9	< × 21		
5		le 19.			Couleu Saveur Pépins Port :	disc- r : B- : s)- : ave	sph-el Gr-Rs- m - a c - ap	ltov- Rg-N r - f	obov-c Jus ox - h	yl-fus : inc		oloré

ANNEE: 1994

NOM Nedeltchef II.4 EMPLACEMENT 7 R10 1386.390

231	8,01			,								
louche	Nbre		rrement mi/déb					Véraison début mi/v fin			Maturité	
	year	Genut	MIT/GGD	grap	lité	Genut	mi/f	III	debut	m1/V	LIN	
2 3 4	2 2 2	28,2 18,2	2.3 x 2.3 x 28,2x 2.3 x	0 0	Crappe Pour :				:	Compa	cité	L - M -
5	1	989	9.3.	a	Baie:				im :			
	6	20,0	L> x						obov-cy	l-fus		
	D 0	L 2.3 &	4(-5)			r : B-0 : s - : avec	Gr-Rs-	Rg-N r - fo yrène	Jus ox - he	: inc	- 00	oloré

ANNEEL: 1935
NOM Nedeltchef VI-4 EMPLACEMENT. 7 RIO 1 386.330

(F)

dododododododododod

2918.01

~	210101														
ouche	Whre		roement mi/déb			Flor	raison	raison mi/v		Maturité					
				, ,							- 5				
1												77.			
2	5			0											
3	4			0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- C										
4	2			0	Pour : Mill :										
5	1			1	Baie :	TC - C	5 - 11	- P I	Dim:						
5	4			0		disc-sp	oh-ell	-ov-ol	nov-cy	l-fus					
					Couleu	<u>r</u> : B-0	Gr-Rs-	Rg-N	đus :	inc -	- col	loré			
					Saveur	: 5	m - a	r - fo	ox - he	erb					
					Pépins	: avec	- ap	yrène							
					Fort: 1/2 erig Vigueur: 2										
		'					0								

AMMETE: 1996 WOM Nedeltakef II 4

EMPLACEMENT. 4 R15 1176-180 3 RIVA 366. 370

			T PP T		7 Res 386.330									
294 ouche	Whre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Floadebut	raison mi/f	Véi début	mi/v	Maturité				
1 2 3 4 8	3	18,3 1813 113	22,3° 18,3 * 23,96 (+6)	0	Grappe Four: Baie: Couleu	TC - disc-s ir : B- is : ave	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P 1-ov-o -Rg-N ar - f	Dim: bov-cy dus ox - h	Compa l-fus : inc	cité	: L - N-1		

N° d'ordre : Nédeltchef II.4

Désignation : 7R 10 A, 386-390 (s.1)

Emplacement : 7R 10

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 189 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

daataalaataalaataalaataal

Etalees - en gouttière - autres.

44

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Nedeltchef II-4 7R10A-386-390(A-1) N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

4

Junion Indianiania

dantadantadantadantad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 263 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Nedeltchef III. 4 7R10 s-386-390(s.3)

dantaalaataalaataalaataal

N° d'ordre : Désignation :

44 Juntani matri

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 159 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

N° d'ordre : Désignation :

4

Nedeltchef II-4 7 R 10 1,386-3901.5

daataalaataalaataalaataal

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 76 (dimensions 11 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 78)

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6)

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré \$1.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 24 x 20).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - pen apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111,

A saveur neutre 12 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121,

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 181 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134,

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 — juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Nedeltchef II-4 7 R 40s. 386-390A:5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

44

dantadantadantadantad

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2), Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : 10.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (51) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6))violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2). saillant (1) effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Désignation: Nedeltchef VI.4 Emplacement: 7 R10 1 386,390 Angle des nervures : 1 - (2)-(3) : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L_1/L_2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 : 17 - 18 - 19 - 20 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

4

N° d'ordre :

<u>Juntumlanda</u>ndantanda

Rennes 92

dantadantadantadantad